


Pâturin commun

Poa trivialis

POACEES

(GRAMINEES)

D. Lecomte et J.C. Simon - INRA



Caractères distinctifs

Espèce glabre de taille moyenne à préfoliation pliée et section aplatie

Feuilles vert tendre, limbes avec traces de ski, carénés à l'extrémité

Lors de la rupture des limbes « les fils » des nervures maintiennent les deux morceaux déchirés.

Ligule transparente, longue et pointue, oreillettes absentes

Inflorescence en panicule pyramidale vert clair

Feuilles devenant rapidement sénescentes après la floraison.

Phytoécologie

Espèce très commune des prairies permanentes et temporaires qui possède une grande amplitude écologique, des terrains frais à très humides proches de la neutralité sur tous types de sols.

Espèce nitrophile des sols riches qui supporte tous les régimes de défoliation.

Espèce à dormance estivale marquée qui produit peu durant l'été.

Compagnes : vulpin des prés, ray-grass anglais, agrostides, fléole des prés, orge faux seigle, trèfle fraise, renoncules, trèfle violet, pâturin annuel, fétuque élevée, fétuque des prés, rumex

Valeur fourragère

C'est une plante très appétente dont la digestibilité est proche de celle du ray grass anglais, mais très sensible à la sécheresse.

Espèce précoce qui épie vers la mi-mai

Sa production importante au printemps demeure nettement inférieure à celle du ray grass anglais quelque soit la fertilisation ou le régime de coupe. En été, la production du pâturin est dérisoire, puis il repart à l'automne.

Fourragère moyenne

Espèce vivace

20 à 80 cm



Mai à juillet