


Chiendent rampant

Agropyrum repens

POACEES

(GRAMINEES)

D. Lecomte et J.C. Simon - INRA



Caractères distinctifs

Plante rhizomateuse à préfoliation enroulée souvent légèrement velue sur la face supérieure du limbe, plus rarement sur la gaine.

Limbes rugueux de couleur bleutée.

Ligules très fines et embrassantes, à ne pas confondre avec l'orge faux seigle dont le feuillage est plus souple

Les épis sont proches de ceux du ray-grass anglais

Phytoécologie

Espèce tardive qui repart au printemps depuis ses nombreux rhizomes, elle est plus fréquente dans les prairies temporaires que dans les prairies permanentes.

Espèce adaptée aux rythmes lents (2 à 3 fauche par an) qui redémarre très lentement après la fauche.

Elle se propage par voie végétative et forme des tâches importantes, mais aussi par graines lors de l'implantation des prairies.

Compagnes : agrostide stolonifère, pâturin des prés, ray-grass anglais, trèfle blanc, chardon des champs, pissenlit, renoncule âcre

Valeur fourragère

La production du chiendent peut-être importante mais le fourrage est très fibreux. C'est une espèce fourragère des zones difficiles à récolter en foin.

Au pâturage, cette espèce, souvent développée lors d'une exploitation à rythmes lents, est refusée par les animaux. Elle doit être maîtrisée par les moyens appropriés : désherbage total et travail du sol avec les outils à dents.

