


Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata

POACEES

(GRAMINEES)

D. Leconte et J.C. Simon - INRA



Caractères distinctifs

Espèce à préfoliation pliée et section très aplatie

Feuilles vert grisâtre, parfois glauque, larges demeurant pliées

Ligule longue, tronquée, oreillettes absentes

Tige robuste portant une panicule rameuse plus ou moins étalée

Espèce à ne pas confondre, au stade feuillu, avec la glycérie flottante (ligule pointue et traces de ski sur les limbes) qui est, contrairement au dactyle, présente sur les sols très humides.

Phytoécologie

Espèce très commune des terrains neutres et calcaires qui résiste bien à la sécheresse, mais redoute l'humidité.

Elle prospère dans les terrains bien pourvus en phosphore, potasse et magnésie et dans les vergers où elle s'accommode de l'ombre.

Cette espèce supporte bien la fauche, mais au pâturage a tendance à faire des touffes.

Compagnes : pissenlit, plantain lancéolé, crénelle, pâquerette, agrostide commune, porcelle, brome mou, renoncule bulbeuse, fromental, grande berce

Valeur fourragère

Espèce très productive en sols sains, à exploiter en fauche au printemps car elle se lignifie très vite lors de la montaison ; en revanche, les repousses feuillues sont bien consommées par les animaux.

Cette espèce, très présente à l'état spontané dans le bocage et le cotentin, se développe en touffes qui sont refusées par les animaux et nécessitent d'être broyées en cours de saison.

C'est une espèce très productive mais difficile à exploiter à associer au trèfle blanc.

30 à 100 cm

Bonne fourragère

Espèce vivace



Mai à juillet